



Ginseng Aktiv

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Doppelherz Ginseng Aktiv Lösung zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Doppelherz Ginseng Aktiv jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Doppelherz Ginseng Aktiv und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Doppelherz Ginseng Aktiv beachten?
3. Wie ist Doppelherz Ginseng Aktiv einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Doppelherz Ginseng Aktiv aufzu-

bewahren?

6. Weitere Informationen

1. **WAS IST DOPPELHERZ GINSENG AKTIV UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**
Doppelherz Ginseng Aktiv ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Anwendungsgebiet:

Traditionell angewendet zur Verbesserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON DOPPELHERZ GINSENG AKTIV BEACHTEN?**

Doppelherz Ginseng Aktiv darf nicht angewendet werden:

- wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagiert haben
- bei Leberkranken
- bei Alkoholkranke
- bei Epileptikern und Hirngeschädigten

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Doppelherz Ginseng Aktiv ist erforderlich:

Dieses Arzneimittel enthält 16 Vol.% Alkohol.

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (1 Gläschen 15 ml) bis zu 1,9 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranke, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Doppelherz Ginseng Aktiv enthält Invertzucker.

Invertzucker ist eine Mischung aus Glucose und Fructose. Bitte nehmen Sie Doppelherz Ginseng Aktiv erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

15 ml enthält 3,6 g einer Mischung aus

Glucose und Fructose. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Doppelherz Ginseng Aktiv kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels liegen bisher keine Untersuchungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Doppelherz Ginseng Aktiv mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Sonstige mögliche Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Doppelherz Ginseng Aktiv sollte wegen des Alkoholgehaltes in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

3. **WIE IST DOPPELHERZ GINSENG AKTIV EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Doppelherz Ginseng Aktiv immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre nehmen 3x täglich ein Gläschen (15 ml) vor den Mahlzeiten ein.

Wenn Sie eine größere Menge Doppelherz Ginseng Aktiv eingenommen haben, als Sie sollten:

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

4. **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Doppelherz Ginseng Aktiv Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. **WIE IST DOPPELHERZ GINSENG AKTIV AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Etikett der Flasche angegebenen Verfalldatum „verwendbar bis“ nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 30 °C aufbewahren.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung:

Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses: 3 Monate

6. **WEITERE INFORMATIONEN**

Was Doppelherz Ginseng Aktiv enthält: Die Wirkstoffe sind:

100 ml (108,3 g) Lösung enthalten:
Ginsengwurzelfluidextrakt (1:1) 3243 mg
[Auszugsmittel: Ethanol 34 % (V/V)]
Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B₆) 6,49 mg

Nicotinamid 54 mg

Coffein 22 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Aromatische Tinktur, Invertzucker-sirup, Honig, Propylenglycol, Zuckercoleur E 150, Natriumcitrat 2 H₂O, Likörwein

Wie Doppelherz Ginseng Aktiv aussieht und Inhalt der Packung:

Doppelherz Ginseng Aktiv ist in Packungen mit 500 ml Lösung erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Telefon 04 61/99 96 - 0
Telefax 04 61/99 96 - 110
E-Mail: info@queisser.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet und genehmigt im: 02/2017




Queisser
PHARMA
GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg